

VETEMEX

EL ANTIEMÉTICO SIMPÁTICO



El nuevo maropitant inyectable de Virbac para el tratamiento y prevención de vómitos y náuseas en perros y gatos.

Con alcohol bencílico y un periodo de validez de 56 días una vez abierto, Vetemex® es la alternativa antiemética simpática.

NUEVO



Maropitant inyectable de Virbac.

Indicado en el tratamiento de...

Gatos

A partir de 16 s

- ✓ Prevención del vómito y de náuseas (excepto el por mareo cinético).
- ✓ Tratamiento del vómito, en combinación con otr

Perros

A partir de 8 semanas

- ✓ Tratamiento y prevención de las náuseas inducidas por quimioterapia.
- ✓ Prevención del vómito (excepto el inducido por mareo cinético).
- ✓ Tratamiento del vómito, en combinación con otras medidas.
- ✓ Prevención de náuseas y vómitos perioperatorios y mejora en la recuperación de la anestesia general.*

*Después del uso de morfina agonista de receptores μ -opiáceos.

Vetemex®

Alcohol bencílico vs metacresol¹


semanas

reducción
inducido

as medidas.


Dolor inmediatamente después de la inyección

A 25 °C (temperatura ambiente) hubo una **reducción del dolor del 78%** utilizando una puntuación analógica visual (VAS).



Dolor 2 minutos después de la inyección

A 25 °C (temperatura ambiente) hubo una **reducción del dolor del 53%** utilizando una puntuación descriptiva simple (SDS).



■ Metacresol ■ Alcohol bencílico

Características

Administración	Vía subcutánea o intravenosa*
	Para prevenir el vómito, administrar con más de 1 hora de antelación
Dosis	1 ml / 10 kg de peso corporal al día durante 5 días consecutivos (máximo)
Presentación	Frasco de 20 ml
Excipiente	Alcohol bencílico
Duración del efecto	24 horas
Periodo de validez una vez abierto	56 días



*Vetemex® por vía intravenosa se debe administrar como bolo individual sin mezclar el producto con cualquier otro líquido.

Bibliografía

1. Deckers N, Ruigrok CA, Verhoeve HP, et al. Comparison of pain response after subcutaneous injection of two maropitant formulations to beagle dogs. Veterinary Record Open 2018; 5:e000262.

Vetemex® 10 mg/ml solución inyectable para perros y gatos Antiemético en solución inyectable **Composición** Maropitant 10 mg/ml. **Indicaciones** Tratamiento y prevención de vómitos y náuseas. **Posología y modo de empleo** 1 mg / kg de p.v. (= 1 ml / 10 kg de p.v.) SC o IV durante un máximo de 5 días. Administrar con más de 1 hora de antelación. **Presentación** Envase de 20 ml. **Reacciones adversas** Dolor en el lugar de inyección. En gatos, muy frecuente respuesta leve o moderada a la inyección. En muy raras ocasiones, reacciones de tipo anafiláctico (edema alérgico, urticaria, eritema, colapso, disnea, palidez de membranas mucosas). **Observaciones** No se ha establecido la seguridad en perros de menos de 8 semanas, en gatos de menos de 16 semanas, ni hembras en gestación o lactancia. Usar con precaución en enfermedades hepáticas y cardíacas. Lávese las manos después de usar. En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico. Puede causar irritación en los ojos: en caso de exposición, lavar con abundante agua y consultar con un médico. **Interacciones** No usar simultáneamente con antagonistas de los canales del calcio. No mezclar con otros medicamentos en la misma jeringa. **Nº de registro** 3733 ESP. Con prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario. CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH.